

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 184
du 15 Novembre 1990

:	:
:	:
:	VIGNE = eutypiose
:	:
:	SALADES = mildiou, botrytis, bactérioses
:	:
:	ARBRES FRUITIERS = tavelure du nefflier, traitements
:	:
:	d'automne sur amandiers
:	:
:	MAIS = attention aux sésamies
:	:
:	:

VIGNE

** eutypiose

La note nationale jointe fait le point sur l'importance de cette maladie. En ce qui concerne notre région, inutile de dramatiser. Quelques foyers existent, certes, mais ils sont rares. Parfois, on observe quelques pieds atteints dans les parcelles.

Rappelons les symptômes :

- végétation buissonnante et rabougrie.
- entre noeuds courts, feuilles parfois déformées
- inflorescences souvent desséchées.
- la coupe transversale du bois laisse apparaître une **nécrose sectorielle** de couleur foncée et de consistance dure.

SALADES

:	Les traitements doivent impérativement être arrêtés au :
:	stade 16-18 feuilles de plus de 3 cm ²
:	:

Lors de chaque traitement, il est recommandé d'utiliser une association de deux fongicides, l'une efficace contre le **mildiou** et l'autre contre le **sclerotinia**. Des **bactérioses** peuvent également faire leur apparition. Elles se traduisent

- soit par des petites taches noires huileuses, au contour anguleux et situées sur le limbe.

- soit par un noircissement du pétiole puis de la nervure principale située dans son prolongement (symptômes des côtes noires)

P. 33

Dans les deux cas, la maladie évolue en pourriture à l'approche de la récolte. Il n'y a pas de traitement curatif. En **préventif**, on peut effectuer des traitements au sulfate de cuivre dès le stade 3 - 4 feuilles. Eliminez rapidement tous les pieds atteints.

ARBRES FRUITIERS

**** Tavelure du néflier**

La protection doit débuter dès maintenant. le premier traitement doit avoir lieu lorsque les 3/4 des pétales sont tombés avec une des spécialités suivantes :

- manébe	160 g ma / hl	
- fenarimol	4 g ma / hl	
- carbatène	200 g ma / hl	
- triforine	38 g ma / hl	(FUNGINEX)
- bitertanol	18,75 g ma/hl	(BAYCOR)

**** Traitements d'automne sur amandier**

Il est grand temps d'appliquer les traitements au cuivre dans les vergers. L'action mécanique de ces traitements aidera à faire chuter les feuilles. Ne pas attendre la chute complète des feuilles pour commencer à traiter. Utiliser des spécialités cupriques à 250 g/hl et renouvelez ce traitement après une pluie importante.

Les attaques de **fusicoccum** sont rares dans notre région. Dans le cas où vous les aurez observées au printemps ou en été, intervenez avec les matières actives suivantes.

- benomyl	BENLATE
- carbendazime	NS
- methylthiophante	PELT 44

Des mélanges sont possibles avec les spécialités cupriques de même marque. Dans tous les cas, bien mélanger la bouillie.

MAIS

Des observations réalisées dans les parcelles de maïs ont mis en évidence la présence de très nombreuses larves de sésamies au niveau du collet des plantes. Il est donc indispensable d'extirper très soigneusement les racines afin d'éviter une reinfestation.

:
: Si vous pensez au desherbage de votre vigne l'an prochain, n'oubliez pas que :
: la dose de **simazine** employée seule ou avec d'autres matières actives ne peut :
: excéder **1500 g /ha/an** (elle était auparavant homologuée à 3000 g/ha). :
: Ces restrictions sont destinées à abaisser le niveau de **résidus de pesticides** :
: dans les eaux :
:
:=====: